

**LE HERON GARDE BOEUF (*Bubulcus ibis*)**

**EN CORSE**

**Par**

**Gilles BONACCORSI\* et Tony ROSSI\*\***

\* Immeuble Azalée, Résidence Biancarello, Chemin de Biancarello, 20090 AJACCIO  
\*\* Groupe ornithologique Corse, immeuble Pietra Marina, Toga, 20200 Bastia



## I INTRODUCTION

Espèce remarquable dont l'expansion mondiale est connue (CRAMP et SIMMONS 1977; HANCOCK et al 1984; DEL HOYO et al 1992), et qui est apparue en France de manière récente (GEROUDET 1978; BLONDEL et ISENMAN 1981, ISENMAN 1993; HAFNER in YEATMAN- BERTHELOT 1991) en arrivant par la Péninsule Ibérique (ISENMAN 1993). L'expansion actuelle en France, provisoirement limitée du fait de vagues de froid (HAFNER et al 1992), a recommencé ensuite grâce à deux facteurs: des immigrants ibériques et ensuite l'auto-recrutement (MARION et MARION 1982; MARION et al 1993; HAFNER et al 1992).

En Corse l'espèce avait un statut d'oiseau "douteux" concernant sa simple présence (THIBAULT 1983) et c'est à partir de 1980 que son statut a évolué: le Héron garde-boeuf est devenu un oiseau régulier aux effectifs limités (un peu plus de 200 observations au 16 novembre 1994).

## II STATUT DU HERON GARDE-BOEUF

La nette modification de son statut au niveau continental (MARION et al 1992) est sans nul doute à l'origine des changements locaux concernant ce héron. Cette espèce ne fut observée que très localement et des sites à priori favorables n'ont jamais reçu sa visite sans que pour autant la pression ornithologique soit le seul facteur à prendre en considération ainsi en est-il de Barcaggio en tant qu'étape durant la migration. Il n'existe qu'une seule mention dans le Cap à Maccinaggio, un le 10 avril 1994 (ROSSI obs pers). Mis à part l'observation de six spécimens le 12 septembre 1976 à l'embouchure de l'Ortolo, puis en d'un en décembre 1980 à Calvi (in THIBAULT 1983), deux mentions à la suite de la vague de froid de janvier 1985: une dans le marais de Canna Gradugine et une à l'embouchure du Rizzanèse (in THIEBOT 1985), entin près de Ghisonaccia au début de l'année 1986 et 4 à 6 à l'automne 1987 (PIETRI obs pers).

Toutes les autres observations furent réalisées dans deux localités: en premier lieu la région de Capitello-Campo dell'Oro et leurs alentours (marais d'Alzone et région d'Ajaccio) (BONACCORSI) enfin l'étang de Biguglia et ses abords à une époque plus récente (CANTERA, ROSSI et DESNOS in chiffré par espèce du Groupe Ornithologique Corse). Car en effet si les premiers spécimens furent notés dès 1980 dans le sud-ouest de l'île, ils ne le furent qu'à partir du 24 mars 1988 à Biguglia (ROSSI obs pers).

En micro-région dans le sud-ouest de l'île 73 mentions furent réalisées de janvier 1980 à novembre 1994 et toutes les observations furent effectuées de décembre (8) à mai (10) concernant d'une part les hivernants, l'hivernage y étant quasi régulier et en second lieu des migrants prénuptiaux. De un à six furent généralement notés. L'hivernage concerna au maximum quatre spécimens et la plus forte concentration fut de 15 le 12 décembre 1983 à Capitello. Lors du passage prénuptial seuls des isolés furent rencontrés.

- A l'étang de Biguglia (et dans ses proches alentours), plus de 116 mentions furent réalisées (ce chiffre correspondant à la période 1990 - 15 novembre 1994) soit le maximum noté en Corse où des oiseaux furent observés lors de ces passages postnuptiaux et prénuptiaux ainsi qu'en hivernage et c'est lors des passages plus qu'en hivernage que le plus grand nombre de mentions eu lieu.

Jamais le passage postnuptial ne fut observé de la même manière aux abords de Capitello. L'ensemble des mentions fut réalisé de septembre (17) à mai (2) avec des effectifs variables (1 à 6 en général) équivalent à ceux notés dans le sud-ouest de l'Île, mais à l'occasion très élevé 18 fois 10 oiseaux et plus, comparé à seulement une fois à Capitello (14 du 27 février au 18 mars 1992 et le 15 mars 1991 constituant les maxima observés on ajoutera que 15 furent notés le 25 novembre 1994). Enfin, les passages pré et post nuptiaux ne concernent pas que des spécimens isolés.

Les oiseaux stationnent dans zones humides, pâturages, embouchures de rivières, et cotoient les bovins et les chevaux, se posant parfois sur eux sans que ceux-ci n'en semblent affectés et ce comme s'ils avaient toujours été côtoyés par ce héron (cette habitude est bien connue HANCKOK et al 1984).

Aucun spécimen bagué ne fut jamais noté lors des différentes observations.

### III DISCUSSION ET CONCLUSION

L'évolution récente des ardeidae a réservé diverses surprises au cours des années 1980 et 1990. Certains ont vu leur situation évoluer dans un sens très favorable (ROCAMORA 1994; ISENMAN 1993; MARION et MARION 1992) tel fut le cas du Héron cendré ou de la Grande aigrette (laquelle essaya de nicher en Camargue et a niché en Loire Atlantique en 1994, MARION et al 1994) ou défavorable comme dans le cas du Blongios nain (DUHAUTOIS 1984, DEL HOYO et al 1992).

En Corse l'évolution la plus perceptible a concerné depuis 1980 le fait que le Blongios nain soit désormais nicheur certain (BONACCORSI), et la présence la Grande aigrette dont la régularité s'est accrue, enfin le Héron garde-boeuf dont la présence fut confirmée. Une nidification de ce héron est-elle possible? Ceci pourrait-être possible surtout s'agissant d'une espèce qui à présent niche en Sardaigne et qui est bien plus adaptable que les autres aigrettes et hérons du fait de sa plus faible dépendance vis-à-vis des zones humides. Il serait intéressant de suivre l'évolution de son statut en tant que visiteur sur les sites connus et en prospectant d'autres lieux.

### REMERCIEMENTS

Ils s'adressent à J.C. THIBAULT qui a bien voulu relire ce texte et me faire des critiques constructives, ainsi qu'à J.P. CANTERA qui m'a fourni les données relatives à d'autres localités consignées dans le fichier du Groupe Ornithologique Corse, fichier par espèce 1974 - 1994.

BIBLIOGRAPHIE

- BLONDEL J. et ISENMAN P. 1981 Guide des oiseaux de Camargue Delachaux et Niestlé Paris.
- BONACCORSI G. Les oiseaux de la Basse Vallée de la Gravona à paraître.
- CANTERA J.P. 1993 Esquisse de l'avifaune nicheuse de la zone humide de Canna Gradugine. Tra.sci. Parc nat. reg. res. nat. Corse Fr. 44; 65 - 80.
- CRAMP S. et SIMMONS K.E.L. (ed.) 1977 Handbook to the birds of western palearctic vol. 1, Oxford University press, Oxford.
- DEL HOYO J.; ELLIOTT A.; SARGATAL J. (ed.) 1992. Handbook of the birds of the world vol 1 Lynx Edicions Barcelona.
- DUHAUTOIS L. juillet-août 1984 Héron pourpré, Butors: le déclin in Le Courrier de la Nature 92; 21 - 29.
- GEROUDET P. 1978. Grands échassiers, gallinacés et râles d'Europe Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- HAFNER H.; PINEAU O.; WALLACE J.P. 1992 The effects of winter climate on the size of the cattle egret (*Bubulcus ibis*) population in the Camargue, Revue d'Ecologie, Terre et Vie n° 47; 403 - 410.
- HANCOCK J. et KUSHLAN J. 1984 The Héron handbook Croom Helm.
- ISENMAN P. 1993 Oiseaux de Camargue SEO Paris.
- MARION L. et MARION P. 1994 Première nidification réussie de la Grande Aigrette (*Egretta alba*) en France, au lac de Grand-Lieu; Alauda vol. 62 n° 3; 149 - 152.
- MARION L. et MARION P. 1982 Le Héron Garde-boeuf (*Bubulcus ibis*) niche dans l'Ouest de la France: statut de l'espèce en France; Alauda; 161 - 175.
- MARION L. , BRUGIERE D. et GRISSER P. 1993 Invasion de Hérons Garde-boeuf (*Bubulcus ibis*) nicheurs en France en 1992 Alauda p. 129.
- ORSINI P. 1994 Les oiseaux du Var; Association pour le muséum d'histoire naturelle de Toulon.
- ROCAMORA G. 1994 Les zones importantes pour la conservation des oiseaux en France, Ministère de l'Environnement, Birdlife International LPO.
- THIEBOT B. 1985 Bulletin de liaison des membres du club ornithologique; centre régional de baguage de la Corse n° 2 avril 1985.
- THIBAULT J.C. 1983 Les oiseaux de la Corse, histoire et répartition aux XIX et XXème siècles; Parc Naturel Régional de la Corse; Gerfau impressions, Paris.
- YEATMAN-BERTHELOT D. 1991 Atlas des oiseaux de France en hiver; SOF, Paris.

Graphiques Fig 1 et Fig 2




Fig. 1 - Phénologie du passage du Héron garde-boeuf dans le sud-ouest de la Corse (1980-1994) N= 73.




Fig. 2 - Phénologie du passage du Héron garde-boeuf à l'étang de Biguglia et ses alentours (1980-1994) N= 116.