


OBSERVATIONS SUR LES OISEAUX D'EAU ESTIVANTS A LA VASIERE



D.C. 10/79



DE TAMBOLO-BIANCO

BIGUGLIA

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA CORSE

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE

OBSERVATIONS SUR LES OISEAUX D'EAU
ESTIVANT A LA VASIERE DE TAMBOLO-BIANCO

- BIGUGLIA -

Bastia, le 1er novembre 1979

S O M M A I R E

- Avant propos
- Plan de situation de la Vasière de Tambolo-Bianco
- Liste systématique des espèces rencontrées
- Espèces rencontrées
- Conclusion
- Références
- Tableau de présence des espèces observées

AVANT - PROPOS

Introduction

Ces observations ont été réalisées par le Club Ornithologique de l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de la Corse entre le 1er juillet et le 1er septembre 1979 ; quelques observations effectuées au mois de juin sont également mentionnées.

Toutes ces observations concernant la vasière de Tambolo-Bianco, endroit très favorable pour l'observation des limicoles et des laridés migrants ou estivants. C'est, en effet, un des seuls endroits de l'étang où les échassiers et certains laridés trouvent des zones favorables pour se nourrir. C'est une vasière d'une dizaine d'hectares située en bordure de la route du Lido sur la rive nord-est en amont des bordigues.

Il existe quelques autres régions de l'étang assez favorables au stationnement des laro-limicoles, mais Tambolo-Bianco abrite les concentrations les plus importantes et présente l'avantage d'être très près de Bastia.

La vasière a été visitée 23 fois en juillet et août, ce qui a permis de réunir un nombre important d'observations, bien que la plupart des sorties étaient effectuées sans télescope.

C'est la première fois qu'une zone humide est contrôlée de cette façon en Corse en période estivale.

La chasse ayant ouverte le 2 septembre très peu de limicoles fréquentaient la vasière en septembre.

A V A N T - P R O P O S (suite)

Observateurs : Daniel et Marc BRUNSTEIN-ALBERTINI, Alain DESBROSSE, Marie-Claire GALETTI, Philippe PICHEROT, Tony ROSSI, Emmanuel SAILLER, Jean-Claude THIBAULT et Roch VUILLEMEN-ORLANDI.

Rédaction du rapport : Marc BRUSTEIN-ALBERTINI et Roch VUILLEMEN-ORLANDI.


Dessin de couverture : Denis CLAVREUL. - Bécasseau variable.

Carte : d'après FRISONI (1978).

BASTIA

BIGUGLIA

1/50 000



Tambolo bianco

Fort

RN 193

BEVINCÒ

PIETRE TURCHI

route du Lido

San
Damiano



NIFACIO

vers GOLO

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES RENCONTREES

Ardeidae :

Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Aigrette garzette
Héron cendré
Héron pourpré

Anatidae :

Anas platyrhynchos
Anas querquedula

Canard Colvert
Sarcelle d'été

Rallidae :

Rallus aquaticus

Râle d'eau

Haematopodidae :

Haematopus ostralegus

Huitrier-pie

Recurvirostridae :

Himantopus himantopus

Echasse blanche

Charadriidae :

Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola

Petit gravelot
Grand gravelot
Gravelot à collier Interrompu
Pluvier doré
Pluvier argenté

Calidridinae :

Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax

Bécasseau minute
Bécasseau de Temmick
Bécasseau cocorli
Bécasseau variable
Combattant

Gallinaginiæ :

Gallinago gallinago

Bécassine des Marais

Tringinae :

Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis cendré
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur

Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos

Chevalier Cul blanc
 Chevalier Sylvain
 Chevalier guignette

Arenariinae :

Arenaria interpres

Tourneperre à collier

Laridae :

Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus

Mouette mélancéphale
 Mouette pygmée
 Mouette rieuse
 Goéland brun
 Goéland argenté

Sternidae :

Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

Sterne caugeck
 Sterne naïne
 Guillette moustac
 Guillette noire

Cette liste est établie d'après Voous (1973, 1977),
List of recent holarctic bird species.

Egretta garzetta Aigrette garzette

Cette espèce a été vue très régulièrement en juin, juillet et août (2 ind. le 1er juin, 5 le 14 et 15 juillet, 1 ind. le 18 juillet, quelques ind. le 22 juillet ; 24 juillet 4 ind. ; 6 le 29 juillet, 7 le 30 juillet, 7 à 10 le 5 août, 5 le 7 août, 3 le 11, 8 le 15, 4 le 17, 1 le 18, 4 le 23, 3 le 26 et le 29, 5 le 31 août, 4 le 1er septembre, 4 le 8 septembre).

Elle pourrait nicher à l'étang mais aucune trace de nidification n'a été découverte.

Ardea cinerea Héron cendré

La nidification de cette espèce est possible : des adultes ont été observé régulièrement en juillet, août et septembre et surtout 2 juvéniles furent notés le 15 août (1 ind. le 11 juillet et le 22 juillet, 2 le 24, 1 le 29, 2 ind. le 5, 11, 15 et 17 août, 4 le 29 août, 1 le 31 août, 5 le 1er septembre, 1 le 8 et 7 le 13 septembre).

Ardea purpurea Héron pourpré

2 individus dont été observé : 1 le 23 août et l'autre le 8 septembre. Les oiseaux fréquentent plutôt les croisillères du sud de l'étang.

Anas platyrhynchos Canard Colvert

Ce canard sédentaire à l'étang de Biguglia, rare à la vasière (TB) a été observé deux fois : 15 ind. le 11 juillet en plumage d'éclipse puis 3 ind. (1 et 2) le 8 septembre.

Anas querquedula Sarcelle d'été

Observée une seule fois (14 juillet, 20 ind.). Il semble qu'elle fréquente plutôt les rives bordées de roseaux, du sud de l'étang (Fornioli).

Rallus aquaticus Râle d'eau

Ce râle sédentaire et migrateur n'a été noté que le 15 août.

Haematopus ostralegus Huîtrier-pie

Observé une seule fois sur la vasière (11 août, 2 ind.).

Migrateur de passage irrégulier dans le reste de la Corse.

.../...

Himantopus himantopus Echasse blanche

L'Echasse a été régulièrement observée (5 ind. le 26 juin, 4 le 26 juin, 8 le 11 juillet, 2 le 14 juillet, 8 le 24, 3 le 29, 5 ind. le 5 août, 2 le 7 août dont un juvénile, 9 le 11 août dont 4 juvéniles, 2 le 15 août, puis 2 le 17 août).

La présence de juvéniles sur la vasière le 22 juillet, le 7 et le 11 août étaye l'hypothèse de Blondel et Frochot (1978) qui supposaient que l'espèce pouvait nicher à Biguglia.

Charadrius dubius Petit gravelot

Cette espèce n'a été vue que deux fois : 1 ind. le 24 juillet et 1 le 5 août.

On sait qu'elle préfère les plages de sable et les embouchures de rivière, aux vasières.

Charadrius hiaticula Grand gravelot

Migrateur régulier en nombre limité ; il a été noté fin juillet et au mois d'août (1 ind. le 24 juillet, 1 ind. le 11 et 15 août, 1 le 26, 2 le 31 puis 4 le 1er septembre).

Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu

Ce gravelot peu farouche a été observé régulièrement au cours du mois d'août (8 ind. le 17 août, 1 ind. les 23 et 29 août).

Pluvialis apricaria Pluvier doré

Migrateur peu commun à cette saison, observé deux fois sur la vasière (1 ind. le 23 août, 2 le 31 août).

Pluvialis squatarola Pluvier argenté

Observé en août seulement (1 ind. le 11 août, 2 le 13 dont 1 en plumage d'été et l'autre en plumage d'hiver, 2 le 31).

Migrateur régulier en Corse, mais toujours en nombre limité.

Calidris temminckii Bécasseau de Temminck

Ce petit bécasseau difficile à distinguer du Bécasseau minute a pu échapper aux observateurs.

Il n'a été observé que deux fois (3 ind. le 31 août, 1 le 1er septembre).

.../...

Les variations quotidiennes peuvent s'expliquer, soit par mouvement de migrants, soit par des dérangements occasionnés par des promeneurs.

Tringa nebularia Chevalier aboyeur

Ce grand limicole au cri sonore a surtout été observé pendant le mois d'août.

(1 Ind. les 14 et 24 juillet, 1 Ind. le 5 août, 3 le 15 août, 1 le 17 août, 3 le 31 août puis 4 le 1er septembre).

Tringa ochropus Chevalier cul blanc

Ce chevalier fut régulièrement observé, mais en nombre limité (2 Ind. le 11 juillet, 1 le 15 juillet, 16 le 24 juillet, 4 le 15 août, 5 le 17 août, 2 le 1er septembre).

Tringa glareola Chevalier sylvain

Ce chevalier est un migrant précoce et régulier bien qu'il passe en Corse en nombre limité (2 Ind. le 11 juillet, 1 le 15 juillet, 16 le 24 juillet, 5 le 15 août, 5 le 17 puis 16 le 1er septembre).

Actitis hypoleucos Chevalier guignette

Ce petit échassier a été observé en juillet et en août, (1 Ind. le 15 juillet, 8 le 18 juillet, 5 le 24 juillet, 2 le 30 juillet, 1 le 5 août, 1 le 7, 4 le 15, 5 à 6 le 18 août, 5 le 1er septembre).

Arenaria interpres Tourne-pierre à collier

Ce limicole rarement signalé en Corse a été noté souvent au mois d'août, il doit être régulier sur l'île, mais il nous faudra attendre quelques années pour le vérifier (1 Ind. le 29 juillet, 1 le 30 juillet, 1 le 7 août, 1 le 18 août, 3 le 31 puis 1 le 1er septembre).

Larus melanocephalus Mouette mélanocephale

Cette mouette a été observée deux fois, 1 Ind. le 15 juillet et 1 le 5 août. Il est possible qu'il s'agisse du même individu, quoiqu'il semble peu probable qu'il ait échappé aux observateurs le 18, 24, 29 et 30 juillet.

Larus minutus Mouette pygmée

Une seule observation, le 29 août (1 individu) de ce visiteur assez régulier en Corse.

Larus ridibundus Mouette rieuse

Cette espèce a souvent été notée sur la vasière.

Calidris ferruginea Bécasseau cocorli

Noté régulièrement à partir du 24 juillet ; les variations d'effectifs peuvent s'expliquer par les dérangements occasionnés par les promeneurs (10 ind. le 24 juillet, 5 ind. le 29, 4 le 5 août, 5 le 18, 3 le 23, 10 le 26, 1 le 30 août, 5 le 31 août, puis 10 le 1er septembre).

Calidris alpina Bécasseau variable

Observé régulièrement en août (4 ind. le 5 août, une dizaine le 11 et 15 août, 2 le 23, 10 le 31 et 6 le 1er septembre).

Pholidochelus pugnax Chevalier combattant

Rarement observé et en nombre limité (1 mâle le 11 juillet, 3 ind. le 24 juillet, 1 ind. le 19 août).

Gallinago gallinago Bécassine des Marais

Observée deux fois à la vasière (1 ind. le 1er septembre et 1 ind. le 8 septembre).

Limosa limosa Barge à queue noire

Notée le 5 août, il est possible que ce soit le même individu qui ait été revu le 7 août.

Limosa lapponica Barge rousse

Un individu est noté le 23 août.

Il s'agit de la seconde observation en Corse.

Numenius arquata Courlis cendré

Observé 3 fois sur la vasière (1 ind. le 14 et le 15 juillet -sûrement le même individu- puis 1 le 5 août).

C'est une migratrice qui fréquente la Corse en nombre limité.

Tringa erythropus Chevalier arlequin

Ce limicole, migrateur assez rarement mentionné en Corse, a été observé à deux reprises pendant le mois d'août (9 ind. le 7 et le 26).

Tringa totanus Chevalier gambette

Ce limicole de taille moyenne au cri flûté a été noté tout au long du mois de juillet et d'août (10 ind. le 11 juillet, 10 le 14 juillet, 3 le 15 juillet, 1 le 18, quelques individus le 22, 6 le 24, 5 le 29 et 10 le 30 juillet, 20 ind. le 5 août, 20 le 7 août, 15 le 17, 2 le 23, puis 10 le 31 août).

Ses effectifs ont augmenté progressivement de juillet à août (6 ind. le 11 juillet dont 2 juvéniles, 15 le 14 juillet, 20 le 15 juillet, 2 le 24 juillet, 8 le 30 juillet, plus de 5 ind. le 5 août, 30 le 7 août, 15 le 17 août, environ 10 le 18 août, 20 le 23 août, 1 le 29 août, 30 le 31 août, 20 le 1er septembre).

L'observation de deux juvéniles en juillet n'implique pas que l'espèce ait niché à Biguglia mais doit nous inciter à la rechercher à cette époque de l'année.

Larus argentatus Goéland dargenté

Durant tous les mois de juillet et d'août, quelques dizaines d'individus stationnaient sur les bordigues, mais après le 2 septembre (ouverture de la chasse), il ne restait plus qu'un ou deux individus qui survolaient la vasière. Le Goéland argenté a été supprimé de la liste des espèces protégées, il semblerait qu'il a été tiré par les chasseurs.

Sterng sandvicensis Sterne caugeck

Un Individu est noté le 24 juillet.

Cette espèce est rarement estivante mais fréquente régulièrement l'île lors des migrations.

Sterna albifrons Sterne naïne

Un Individu est observé le 14 juillet.

La nidification sur les plages peu fréquentées n'est pas à exclure.

Chlidonias hybridus Guifette moustac

Cette guifette ne fut notée qu'une fois (1 ind. le 15 juillet).

Elle semble beaucoup plus rare que la Guifette noire.

Chlidonias niger Guifette noire

Cette espèce a été observée régulièrement sur la vasière de Tambolo-Blanco (+ de 200 ind. le 11 août, 2 le 15 août, 100 environ le 17 août, + de 10 le 18 août, 3 le 26 août, 3 le 31 août, environ 5 le 1er septembre).

La Guifette noire doit émigrer par la Corse en nombre important.

CONCLUSIONS

Quoique de superficie très limitée, la vasière de Tambolo-Blanco est un endroit privilégié pour le stationnement des laro-limicoles qui y trouvent en migration une étape pour se nourrir et se reposer. Par ailleurs, certaines espèces pourraient y nicher si elles étaient moins dérangées. L'impact a été très significatif. Comme les années précédentes, le lendemain de l'ouverture de la chasse, Tambolo-Blanco a été déserté en majeure partie par les laro-limicoles qui ont poursuivi plus au sud leur migration. La superficie de la vasière est trop limitée pour qu'ils trouvent une zone tranquille les jours de chasse.

REFERENCES

Blondel (J.) et Frochot (B.) 1978.- Notes d'ornithologie corse.
Ols. Rev. fr. Orn. 48, 181-193

(C.T.G.R.E.F.) 1978.- Inventaire des zones humides du littoral oriental Corse.

CORRECTIONS

P. 9, entre Pluvier argenté et Bécasseau de Temminck
lire :

Calidris minuta Bécasseau minute

Ce petit bécasseau a été souvent observé et parfois en nombre important (7 ind. le 24 juillet, 2 et + le 29 juillet, 1 dizaine le 30 juillet, une dizaine le 5 août, nombreux le 11 août, 40 le 15 août, 80 le 17 août, 5 le 29 août, 10 le 31 août et plus de 10 le 1er septembre).

P. 11, entre Mouette rieuse et Goéland argenté
lire :

Larus fuscus Goéland brun

1 ind. est noté le 5 août. Son plumage, très clair sur le dos, montre qu'il appartient à la forme L. f. graellsii.